

## Topf- und Kübelpflanzenraritäten

Vortrag von Ulrich Braunsdorf, Hessische Gartenakademie des LLH  
am 12. Januar 2011

### **Spilanthes oleracea (Acmella oleracea)**

#### **Asteraceae**

Parakresse

**Heimat:** Brasilien

**Wuchsform:** Kraut, nicht winterhart (in der Heimat  
Staude

**Blüte:** Sommer

#### **Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C, im Winter um 15 °C;  
hell, sonnig

#### **Substrat:**

50 % Landerde, 30 % Torf, 20 % Grobsand

**Vermehrung:** Aussaat, Stecklinge

**Besondere Pflegehinweise:** Schnitt erforderlich,  
dadurch kompakterer Wuchs und bessere  
Verzweigung; Spinnmilben

Deutsch: Brasilkresse, Husarenknopfblume, Prickelblume

Englisch: Paracress, Toothache plant, Brazil cress

Parakresse ist geruchlos; ihr Geschmack entwickelt  
sich im Mund langsam von angenehm pikant-salzig zu  
einer ganz erheblichen, prickelnd-brennenden Schärfe,  
die im Mund ein taubes Gefühl zurückläßt.

Lokalanästhetische Wirkung von einem Alkamid  
(Spilanthol), das bei Zahnschmerzen zu einer zeitlich  
befristeten Schmerzlinderung führen kann

[http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/Spil\\_acm.html](http://www.uni-graz.at/~katzer/germ/Spil_acm.html)

**Tetranema roseum**  
**(Scrophulariaceae)**

Mexikanisches Leberblümchen

**Heimat:** Mexiko

**Wuchsform:** kurzer Stamm mit glatten, ledrigen Blättern und einem ca. 10 cm hohen Schaft, an dem die Blüten sitzen

**Blüte:** Sommer

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 18 – 20 °C,

im Winter um 15 °C;

halbschattig

**Substrat:**

50 % Landerde, 30 % Torf, 20 % Grobsand

**Vermehrung:** Aussaat

**Besondere Pflegehinweise:** ältere Pflanzen sollen am schönsten blühen ; hohe Luftfeuchte empfehlenswert

**Duranta erecta**  
**(Verbenaceae)**

Goldener Tautropfen

**Heimat:** Mexiko, Südamerika

**Wuchsform:** kleiner Strauch, bis 2 m

In den Tropen Heckenpflanze

**Blüte:** Sommer

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,

im Winter um 15 °C; hell, sonnig

**Substrat:**

50 % Landerde, 30 % Torf, 20 % Grobsand

**Vermehrung:** Aussaat, Stecklinge

**Besondere Pflegehinweise:** Schnitt erforderlich; im Winter sparsam gießen

<http://www.stuartxchange.org/Duranta.html>

**Solandra maxima**  
(Solanaceae)

Goldkelch

**Heimat:** Mexiko

**Wuchsform:** Kletterpflanze

**Blüte:** Sommer

**Temperatur- und Lichtansprüche:**  
im Sommer 20 – 25 °C, im Winter um 15 °C;  
hell, sonnig

**Substrat:**  
50 % Landerde, 30 % Torf, 20 % Grobsand

**Vermehrung:** Stecklinge

**Besondere Pflegehinweise:** Schnitt erforderlich; im Winter sparsam gießen

**Solandra grandiflora** (Goldkelch)

**Heimat:** Jamaica, Mexiko

**Cattleya intermedia x Brassavola nodosa**  
(Orchidaceae)

Cattleya-Hybride

**Heimat:** Brasilien

**Wuchsform:** Epiphyt

**Blüte:** Spätherbst

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,

im Winter um 15 °C;

halbschattig

**Substrat:**

70 % Osmunda, 20 % Sphagnum , 10 %

Rinde

**Vermehrung:** Teilung, in Spezialbetrieben Aussaat und Meristemvermehrung

**Besondere Pflegehinweise:** Wasserversorgung durch Tauchen; im Winter sparsam gießen

**Besondere Pflegehinweise:**,

**keine direkte Sonne!**

<http://www.orchideenpflegen.de/cattleya-orchideen/>

[http://interorchids.com/Cattleya/Orchid\\_Cattleya.jpg](http://interorchids.com/Cattleya/Orchid_Cattleya.jpg)

**Coelogyne cristata**

(Orchidaceae)

Coelogyne

**Heimat:** Nepal

**Wuchsform:** Epiphyt

**Blüte:** Januar bis April

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C, im Winter um 15 °C;

halbschattig

**Substrat:**

70 % Osmunda, 20 % Sphagnum , 10 %

Rinde

**Vermehrung:** Teilung, in Spezialbetrieben Aussaat und Meristemvermehrung

**Besondere Pflegehinweise:** Wasserversorgung durch Tauchen; im Winter sparsam gießen

**Kalanchoe beharensis**  
(Crassulaceae)

**Heimat:** Südmadagaskar

**Wuchsform:** Stammtrieb mit großen, dreieckigen Blättern, flaumiger, weißer bis brauner Belag, Höhe  $\geq 150$  cm

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,

im Winter um 15 °C;

hell bis vollsonnig

**Substrat:**

Durchlässig, lehmig-sandig

**Vermehrung:** Kindel an der Basis, Blatteilstecklinge, Kopfstecklinge

**Besondere Pflegehinweise:** im Winter sparsam gießen

**Boronia heterophylla**  
(Rutaceae)

Korallenraute

**Heimat:** Südwestaustralien

**Wuchsform:** immergrüne, kleine Sträucher, rosarote Blüten mit Himbeerduft

**Blüte:** März bis April

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C, auch im Freien,

im Winter um 5 - 8 °C;

halbschattig bis schattig

**Substrat:**

Rhododendronerde

**Vermehrung:** ausgereifte, krautige Stecklinge

**Besondere Pflegehinweise:**

Gießen – nicht zu viel, nicht zu wenig,  
Möglichst Regenwasser

**Sansevieria cylindrica**

(Dracaenaceae)

Bogenhanf

**Heimat:** Angola

**Wuchsform:** kurzes, dickes Rhizom mit aufrechten,  
zylindrischen Blättern,

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,  
im Winter um 15 °C; sonnig

**Substrat:**

Lehmige, nährstoffreiche Erde

**Vermehrung:** Teilung,

**Besondere Pflegehinweise:** im Winter  
sparsam gießen, für Hydrokultur  
geeignet

**Astrophytum ornatum**

(Cactaceae)

Bischofsmütze

**Heimat:** Mexiko

**Wuchsform:** anfangs kugel-,  
später walzenförmig

**Blüte:** Juni bis August

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,  
im Winter um 10 - 15 °C;  
hell, sonnig

**Substrat:**

60 % Landerde, 10 % Torf, 30 % Grobsand

**Vermehrung:** Aussaat, Veredlung

**Besondere Pflegehinweise:** im Winter sparsam gießen

[www.cactus-art.biz/schede/ASTROPHYTUM/Astroph..](http://www.cactus-art.biz/schede/ASTROPHYTUM/Astroph..)

## **Corokia cotoneaster**

**(Asteraceae)**

Zickzackstrauch

**Heimat:** Neuseeland

**Wuchsform:** Kleinstrauch

**Blüte:** Juni bis Juli

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,

im Winter um 10 °C;

sonnig

**Substrat:**

70 % Landerde, 20 % Sand , 10 % Torf

**Vermehrung:** Kopfstecklinge im Sommer

**Besondere Pflegehinweise:** mäßig  
giessen und düngen

## **Curcuma alismatifolia**

**(Zingiberaceae)**

Safranwurz

**Heimat:** Tropische Gebiete im Himalaya, Ceylon

**Wuchsform:** Kräuter mit dickem Wurzelstock

**Blüte:** Spätherbst (Hochblätter)

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,

im Winter um 20 °C;

sonnig bis halbschattig

**Substrat:** Einheitserde oder Mischung aus  
Lauberde und Lehm mit Sandzusatz

**Vermehrung:** Teilung der Rhizome nach Ruhezeit

**Besondere Pflegehinweise:**

Blätter sterben im Spätherbst ab, Ruhezeit bei 18 – 20 °C, trocken bis Ende Februar, dann neu pflanzen

**Boswellia sacra**

(Burseraceae)

Weihrauch

**Heimat:** Somalia, Oman, Jemen

**Wuchsform:** kleiner stark verzweigter Baum, Laubblätter unpaarig gefiedert

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 30 °C,

im Winter um 15 °C;

hell, kühl, frostfrei überwintern

**Substrat:**

1. rein mineralisches Substrat mit Kalkanteil

2. Sand und Kies und Einheitserde zu gleichen Teilen

**Vermehrung:** Aussaat, Stecklinge, schwierig zu vermehren!

**Besondere Pflegehinweise:** im Winter wenig gießen, 1 – 3 Mal, abtrocknen lassen, im Mai sonnig stellen

<http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/191275>

**Drosera capensis**

(Droseraceae)

Kap-Sonnentau

**Heimat:** Südafrika

**Wuchsform:** Rosette

**Blüte:** Mai - August

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,  
im Winter um 15 °C;  
sonnig; kann auch im Sommer im Freiland  
gehalten werden

**Substrat:** Sand, Torf

**Vermehrung:** Aussaat (Lichtkeimer),  
Blattstecklinge

**Besondere Pflegehinweise:** Hohe  
Luftfeuchte, abgestorbene Blätter  
entfernen, sonst Botrytis

**Eucharis amazonica**

(Amaryllidaceae)

Eucharis

**Heimat:** Südamerika

**Wuchsform:** Blätter ähnlich Hosta, aber  
Zwiebelpflanze, Blütenschaft mit duftenden  
weißen Blüten,

**Blüte:** Mai, August, Dezember

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,  
im Winter um 15 °C;  
schattig bis halbschattig

**Substrat:** 20 % Sand, 30 % Gartenerde,  
50 % Torf

**Vermehrung:** Tochterzwiebeln, im März  
oder August

**Besondere Pflegehinweise:** kann 2 bis  
3 mal im Jahr blühen (Mai, August,  
Herbst); Umtopfen alle 3 bis 4 Jahre

**Ceropegia linearis ssp. woodii**  
(Asclepiadaceae)

(Leuchterblume)

**Heimat:** Südafrika

**Wuchsform:** haselnussgrosse Knöllchen mit hängenden oder kriechenden, fadenförmigen Stengeln, ideale Ampelpflanze, Blüte Kesselfalle

**Blüte:** Januar bis Dezember

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C,

im Winter um 15 °C;

sonnig bis halbschattig

**Substrat:** durchlässige, humose Erde mit Sandanteil

**Vermehrung:** Stecklinge

**Besondere Pflegehinweise:** unproblematisch

**Passiflora caerulea**  
(Passifloraceae)

Passionsblume

**Heimat:** Südamerika

**Wuchsform:** Kletterpflanze

**Blüte:** Juli bis September

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 20 – 25 °C, auch im Freien;

im Winter um 3 -6 °C; bedingt winterhart;

Sonniger Standort

**Substrat:** 20 % Sand, 50 % Gartenerde, 30 % Torf (lehmig-humos)

**Vermehrung:** Stecklinge,  
Aussaat möglich, aber Pflanzen nicht blühwillig

**Besondere Pflegehinweise:**

Im März auf 4 bis 6 Augen zurückschneiden,  
anfällig für Blatt- und Wollläuse, Spinnmilben

**Lapageria rosea**

(Philesiaceae)

Chilenische Glockenblume (Nationalblume)

**Heimat:** südliches Chile

**Wuchsform:** windender Kletterstrauch,  
ledrige Blätter, Früchte essbar

**Blüte:** August bis Dezember

**Temperatur- und Lichtansprüche:**

im Sommer 15 – 20 °C, schattieren,  
für feuchte, kühle Luft sorgen  
im Winter um 10 °C; hell,

**Substrat:**

60 % Landerde, 10 % Torf, 30 %  
Grobsand, sehr gute Drainage erforderlich

**Vermehrung:** Aussaat,

**Besondere Pflegehinweise:** stärkeren Rückschnitt vermeiden

Trockenheit ist tödlich,  
gut für Küstengegenden und Gebirgslagen